ANTIVERRUGAS ISDIN

Solución tópica

Composición

Cada 100 ml contienen:

| Acido salicílico | 16,7 g |
|-------------------------|---------|
| Acido láctico | 16,7 g |
| Colodión elástico c.s.p | .100 ml |

Indicaciones

Tratamiento de las verrugas cutáneas.

Posología y modo de empleo

Una aplicación diaria. Antes de la aplicación del producto se aconseja frotar la superficie de la verruga con una lima.



Aplicar con la espátula una gota de Antiverrugas ISDIN sobre la verruga a tratar, evitando tocar la zona de la piel sana circundante ya que se producirían quemaduras, proteger esta zona con una pomada o crema oleosa (vaselina...).



Dejar secar y recubrir con un esparadrapo durante 12 horas. Repetir la operación hasta la total desaparición de la verruga.



Contraindicaciones

Alergia a alguno de los componentes. No utilizar en pacientes con Diabetes Mellitus o con problemas de circulación periférica.

Interacciones

Dada la acción queratolítica del producto, no debe aplicarse conjuntamente con otro queratolítico para no aumentar la capacidad cáustica de sus componentes activos.

Efectos secundarios

Puede producir enrojecimiento de las zonas adyacentes.

Advertencias

Alejarlo de los ojos. Sólo para uso externo. No Ingerir. Muy inflamable. Evitar fumar durante su aplicación. Manténgase el frasco bien cerrado.

Precauciones

Evitar el contacto del producto con la piel o las mucosas. Aclarar con agua si el líquido entra en contacto con la piel que no ha de ser tratada.

No aplicar si la piel está inflamada, enrojecida, infectada, levantada o herida.

Consultar al médico si las verrugas son abundantes o si se produce infección o inflamación.

Aunque pueden ser necesarias 12 semanas de tratamiento, consultar al médico si no se nota mejoría después de 2 semanas.

Intoxicación y su tratamiento

En el caso de ingestión accidental por vía oral se administrarán líquidos, preferentemente leche, para diluir su acción corrosiva. Acudir a un centro médico indicando el producto y la cantidad ingerida, para que procedan a provocar el vómito y/o lavado gástrico si lo juzgan necesario.

Consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

Presentación

Frasco de 20 ml

SIN RECETA MEDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Fabricado por: Recipharm Parets, S.L.

Ramon y Cajal, 2 08150 Parets del Vallés

(Barcelona)

Isdin SA Provençals 33 08019 Barcelona España